



MAÏS

Région	HYBRIDE	Région																						
		Maturité relative	Réponse à la population (RAP)	UTM	Réponse aux fongicides (RAF)	Réponse à l'azote (RAN)	Hauteur du plant	Hauteur de l'épi	Couleur de la rafle	Flexibilité de l'épi	Date de floraison	Nombre de rangées de grains	Vigueur	Vigueur printanière	Qualité des tiges	Verdeur tardive	Tolérance à la sécheresse	Poids spécifique	Helminthosporiose du nord	Tache grise	Rouille courante	Flétrissement bactérien	Pourriture de la tige (anthracnose)	
			①		①	①	②	③	④	⑤						⑥								
E	CP1225VT2P/RIB*	71	2050	M	À DÉT.	À DÉT.	M-G	M-H	ROUGE	SF	H	16-18	1	2	3	3	2	3	1	3	3	2	3	3
O	E CP1221VT2P/RIB* NOUVEAU	72	2050	M	À DÉT.	À DÉT.	M	M	ROUGE	SF	M-H	18-20	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	4	3
O	E CP1440VT2P/RIB*	76	2150	M	M	M	M	M	ROUGE	FX	M-H	16-18	2	2	1	2	1	2	2	3	2	N/D	2	3
O	E CP2130VT2P/RIB*	81	2350	M	M	É	M-G	M-H	ROUGE	SF	H	16-18	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2
O	E CP2288VT2P/RIB*	82	2450	É	É	M	M	M	ROUGE	SF	M	16-18	2	1	1	2	2	2	1	N/D	2	N/D	2	3
O	E CP2324VT2P/RIB*	83	2500	M	M	M	M	M	ROSE	SF	M	16-18	2	2	2	3	2	2	4	4	3	2	2	2
O	E CP2585VT2P/RIB*	85	2625	M	É	É	M	M	ROUGE	SF	M	16-18	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	2
O	E CP2585SS/RIB*	85	2625	M	M	F	M	M	ROUGE	SF	M	16-18	2	2	2	2	3	3	3	4	3	2	3	2
O	E CP2667VT2P/RIB* NOUVEAU	87	2650	M	À DÉT.	À DÉT.	M	M	ROUGE	SF	M	14-16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
O	E CP2790CONV	87	2625	F	É	É	M	M	ROUGE	SF	H	16-18	1	3	2	3	2	1	2	3	2	N/D	4	3
O	E CP2790VT2P/RIB*	87	2650	F	É	É	M	M	ROUGE	SF	H	16-18	1	3	2	3	2	1	2	3	2	N/D	4	3
O	E CP2845VT2P/RIB*	88	2675	É	É	É	M-G	M	ROUGE	SF	H	16-18	1	2	1	3	1	1	3	N/D	3	3	4	4
E	CP2925TRE/RIB*	89	2700	M	F	F	M	M	ROUGE	FX	M	16-18	2	3	2	2	2	2	1	3	3	2	3	3
E	CP2965VT2P/RIB*	89	2700	M	É	É	M	M	ROUGE	SF	M	14-16	1	1	2	3	2	2	2	3	3	N/D	3	2
E	CP2972SS/RIB*	89	2725	M	É	M	M-G	M-H	ROUGE	SF	M-H	16-18	2	2	2	3	3	2	1	3	2	N/D	2	2
E	CF398VT2P/RIB*	89	2725	N/D	N/D	N/D	M	M	ROUGE	SF	M	16-18	2	1	1	2	2	2	2	2	2	N/D	N/D	3
E	CP3166CONV	91	2700	É	M	M	M	M	ROUGE	SF	H	16-18	2	3	3	3	2	2	3	3	3	N/D	3	2
E	CP3166VT2P/RIB*	91	2750	É	M	M	M	M	ROUGE	SF	H	16-18	2	3	3	3	1	2	3	3	3	N/D	3	2
E	CP3143VT2P/RIB*	91	2775	F	É	M	M-G	M-H	ROUGE	SF	M-T	18-20	2	2	2	2	3	2	2	4	3	2	3	3
E	CP3255SSPRO/RIB* NOUVEAU	92	2775	É	À DÉT.	À DÉT.	M-G	M	ROUGE	SF	M	16-18	1	2	2	1	2	3	3	3	3	N/D	3	2
E	CP3330CONV NOUVEAU	93	2800	M	M	F	M-G	M-H	ROUGE	SF	M	16-18	2	1	1	2	2	2	2	3	3	2	2	1

LÉGENDE

Échelle

- 1 = Excellent
- 2 = Supérieur à la moyenne
- 3 = Moyenne
- 4 = Inférieur à la moyenne
- 5 = Passable

Les descriptions et les évaluations des produits sont générées à partir d'essais en champ dans la Zone Performance et/ou du fournisseur de génétique et peuvent changer à mesure que des données supplémentaires sont recueillies.

1 Indices RAP/RAN/RAMM/RAF

- F = Réponse faible
- M = Réponse moyenne
- É = Réponse élevée
- À déterminer = À tester en 2027.

2 Hauteur du plant

- G = Grand
- M = Moyen
- C = Court

3 Hauteur de l'épi

- H = Haut
- M = Moyen
- B = Bas

4 Flexibilité de l'épi

- FL = Flexible
- SF = Semi-flexible
- FX = Fixe

5 Date de floraison

- T = Tardive
- M = Moyenne
- H = Hâtive

6 Verdeur tardive

- Bonne santé de fin de saison grâce à la forte résistance aux maladies des feuilles, renforçant la tenue de l'hybride.



*Avant d'ouvrir un sac de semences, assurez-vous de lire, de comprendre et d'accepter les exigences en matière de gestion responsable, y compris les exigences applicables aux refuges pour la gestion de la résistance des insectes et celles concernant les caractères biotechnologiques présents dans les semences, telles que définies dans l'accord de gestion responsable des technologies de Bayer que vous signez. En ouvrant et en utilisant un sac de semences, vous confirmez votre obligation de vous conformer aux exigences les plus récentes en matière de gestion responsable.

O = Hybride pour l'ouest du Canada | E = Hybride pour l'est du Canada



Région	HYBRIDE	Région																						
		Maturité relative	Réponse à la population (RAP)	Réponse à l'azote (RAN)	Réponse aux fongicides (RAF)	Hauteur du plant	Hauteur de l'épi	Couleur de la rafle	Flexibilité de l'épi	Date de floraison	Nombre de rangées de grains	Vigueur printanière	Qualité des tiges	Vigueur des racines	Verteur tardive	Tolérance à la sécheresse	Séchage	Poids spécifique	Helminthosporiose du nord	Tache grise	Rouille courante	Fétrissement bactérien	Pourriture de la tige (anthracnose)	
		UTM	1	1	1	2	3	4	5						6									
E	CP3330VT2P/RIB*	93	2800	M	M	F	M-H	M-H	ROUGE	SF	M	16-18	2	1	1	2	2	2	2	3	3	2	1	
E	CP3341SS/RIB*	93	2800	M	M	F	M	M	ROUGE	FX	M	14-16	3	3	3	3	2	2	2	3	2	N/D	3	2
E	CP3490VT2P/RIB*	94	2850	M	M	É	M-H	M-H	ROUGE	SF	M-T	18-20	1	3	3	3	3	2	3	3	3	N/D	3	3
E	CP3575CONV	95	2800	É	É	M	M	M	ROUGE	SF	M-T	16-18	2	2	2	2	2	3	1	3	2	N/D	4	1
E	CP3575VT2P/RIB*	95	2825	É	É	M	M	M	ROUGE	SF	M-T	16-18	2	2	2	2	2	3	1	3	2	N/D	4	1
E	CP3575SS/RIB*	95	2850	É	É	M	M	M	ROUGE	SF	M-T	16-18	2	2	2	2	2	3	1	3	2	N/D	4	1
E	CP3540VT4P/RIB*	95	2850	M	À DÉT.	À DÉT.	M-H	M-H	ROUGE	SF	M	16-18	2	3	3	3	2	3	3	3	3	N/D	N/D	1
E	CP3715SSPRO/RIB*	97	2950	M	M	M	M-H	M-H	ROUGE	SF	M-H	18-20	2	2	1	2	2	2	3	4	2	2	2	2
E	CP3720TRE/RIB*	97	2900	M	É	M	M	M	ROUGE	SF	H	16-18	2	2	2	2	2	2	1	2	2	N/D	N/D	3
E	CP3735VT2P/RIB*	97	2900	M	É	É	M	M	ROUGE	SF	M	16-18	1	2	2	2	2	3	1	3	3	N/D	3	3
E	CP3790VT2P/RIB*	97	2925	F	M	É	H	M-H	ROUGE	SF	M-T	16-18	2	2	4	2	2	2	2	4	3	2	2	3
E	CP3823SS/RIB*	98	2925	M	À DÉT.	À DÉT.	M-H	M	ROUGE	SF	M	16-18	2	1	2	3	3	2	1	3	2	N/D	2	1
E	CP3980VT2P/RIB*	99	2950	M	M	É	M-H	M-H	ROUGE	SF	M	14-16	2	3	2	3	2	3	3	2	N/D	N/D	3	3
E	CP4121VT4P/RIB* NOUVEAU	101	3050	F	À DÉT.	À DÉT.	M-H	M	ROUGE	SF	M	16-18	1	2	2	2	2	2	3	3	2	N/D	4	2
E	CP4188CONV	101	2950	M	M	M	M	M	ROUGE	SF	M	16-18	1	1	1	1	3	2	1	3	2	N/D	2	3
E	CP4188VT2P/RIB*	101	3000	M	M	M	M	M	ROUGE	SF	M	16-18	1	1	1	1	3	2	1	3	2	N/D	2	3
E	CP4188SS/RIB*	101	3025	M	M	M	M	M	ROUGE	SF	M	16-18	1	1	1	1	3	2	1	3	2	N/D	2	3
E	CP4265VT2P/RIB*	102	3050	M	F	M	M	M	ROUGE	SF	M-T	16-18	1	2	1	3	1	3	3	3	3	N/D	2	3
E	CP4233TRE/RIB* NOUVEAU	102	3100	É	À DÉT.	À DÉT.	M	M	ROUGE	FX	T	14-16	2	2	2	3	3	3	2	3	À DÉT.	N/D	N/D	À DÉT.
E	CP4377TRE/RIB	103	3100	M	À DÉT.	À DÉT.	M	M	ROUGE	SF	M-H	16-18	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	2
E	CP4516TRE/RIB*	105	3150	M	M	É	M	M	ROUGE	SF	M-H	16-18	2	3	2	2	2	3	2	3	3	2	2	2
E	CP4676SS/RIB*	106	3175	M	É	M	M	M	ROSE	SF	M	16-18	1	3	3	2	1	3	1	3	2	N/D	3	1
E	CP4689PCE RE NOUVEAU	106	3200	M	É	M	M-H	M-H	ROSE	SF	T	16-18	2	2	2	2	3	1	2	3	2	2	2	2
E	CP4757VT2P/RIB*	107	3200	M	M	M	M	M-H	ROUGE	FX	M	18-20	3	3	2	3	2	2	2	3	2	N/D	3	3

LÉGENDE

Échelle

- 1 = Excellent
- 2 = Supérieur à la moyenne
- 3 = Moyenne
- 4 = Inférieur à la moyenne
- 5 = Passable

Les descriptions et les évaluations des produits sont générées à partir d'essais en champ dans la Zone Performance et/ou du fournisseur de génétique et peuvent changer à mesure que des données supplémentaires sont recueillies.

1 Indices RAP/RAN/RAFM/RAF

- F = Réponse faible
- M = Réponse moyenne
- É = Réponse élevée
- À déterminer = À tester en 2027.

2 Hauteur du plant

- G = Grand
- M = Moyen
- C = Court

3 Hauteur de l'épi

- H = Haut
- M = Moyen
- B = Bas

4 Flexibilité de l'épi

- FL = Flexible
- SF = Semi-flexible
- FX = Fixe

5 Date de floraison

- T = Tardive
- M = Moyenne
- H = Hâtive

6 Verdeur tardive

- Bonne santé de fin de saison grâce à la forte résistance aux maladies des feuilles, renforçant la tenue de l'hybride.



Planting Resilience, Preserving Technology

*Avant d'ouvrir un sac de semences, assurez-vous de lire, de comprendre et d'accepter les exigences en matière de gestion responsable, y compris les exigences applicables aux refuges pour la gestion de la résistance des insectes et celles concernant les caractères biotechnologiques présents dans les semences, telles que définies dans l'accord de gestion responsable des technologies de Bayer que vous signez. En ouvrant et en utilisant un sac de semences, vous confirmez votre obligation de vous conformer aux exigences les plus récentes en matière de gestion responsable.

0 = Hybride pour l'ouest du Canada | E = Hybride pour l'est du Canada